



НИВАТОН®

Секрет успіху високого врожаю



ЗМІСТ

▶ Про компанію

▶ Місія та стратегія

▶ Партнерства та успішні кейси

▶ Виробництво

▶ Продуктовий портфель

▶ Дослідження та якість

▶ Висновки

▶ Контакти



ПРО КОМПАНІЮ



НИВАТОН®

Секрет успіху високого врожаю

ПРО КОМПАНІЮ

Ниватон®—український виробник інноваційних мікродобрив, біостимуляторів та спеціалізованих продуктів для агробізнесу. Компанія створена для підтримки сучасного сільського господарства через впровадження ефективних рішень, що підвищують продуктивність і стійкість культур. Завдяки передовим технологіям виробництва та контролю якості, продукція ТМ Ниватон® адаптована до різних кліматичних умов і забезпечує високу результативність на полях клієнтів по всій Україні.



МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЯ

Місія —підтримувати сталий розвиток агробізнесу, надаючи інноваційні фоліарні добрива, що підвищують врожайність і зберігають родючість ґрунту. Ми прагнемо створювати рішення, які сприяють екологічному балансу та забезпечують довготривалу продуктивність, водночас підтримуючи фермерів у вирішенні ключових аграрних викликів.

СТРАТЕГІЯ БРЕНДУ

Ниватон®—надійний партнер аграріїв, що забезпечує сталий розвиток агробізнесу завдяки сучасним фоліарним добривам.



Наші клієнти



Виробництво



Виробництво





Склад сировини

Індивідуальні замовлення

Продуктова корзина

- ▶ Моноелементні добрива
- ▶ Комплексні мікродобрива
- ▶ Біостимулятори антистресанти, передпосівна обробка насіння
- ▶ Спеціальні продукти
- ▶ Рідкі комплексні добрива



Моноелементні добрива



НИВАТОН®
Секрет успіху високого врожаю

Моноелементні добрива

- ☐ Ниватон® Бор 150
- ☐ Ниватон® Смарт Бор
- ☐ Ниватон® Бор Молибден
- ☐ Ниватон® Цинк 100 EDTA
- ☐ Ниватон® Цинк 120 Citric
- ☐ Ниватон® Цинк 65 Etidronic
- ☐ Ниватон® Мідь Citric
- ☐ Ниватон® Мідь EDTA
- ☐ Ниватон® Марганець EDTA
- ☐ Ниватон® Молибден
- ☐ Ниватон® Молибден-Кобальт
- ☐ Ниватон® Калій



Моноелементні добрива

Ниватон®БОР 150

Класичне борне мікродобриво містить бор у формі органічного комплексу з етаноламіномі призначене для листового підживлення широкого спектру культур. Висока ефективність і зручна препаративна форма зробили цей препарат «золотим стандартом» агросектору.

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Осінь – початок кущення	0,5
Кукурудза	3–7 листків	0,5 – 1,0
	2–3 пари листків	1,0
Соняшник	5–6 пар листків	1,0
Ріпак	2–5 пар листків (осінь)	1,0
Бобові (горох, соя)	Стеблуння, бутонізація (весна)	1,0 – 1,5
Томати, перець, баклажан	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Льон	Бутонізація	0,5 – 1,0
Картопля	Стадія «ялинки»	1,0
	Бутонізація	0,5 – 1,0
	Рожевий бутон	0,5 – 1,0
Плодові та ягідні	Формування плодів	0,5 – 1,0
	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
Виноград	Перед цвітінням	0,5 – 1,0
	Перед дозріванням	0,5 – 1,0
Суниця	Перед цвітінням	0,5
Буряки цукрові	Змикання листків в рядках, міжряддях	0,5 – 1,5

- Профілактика та лікування дефіциту бору
- Формування репродуктивних органів
- Підвищення стійкості до стресів
- Захист від грибкових захворювань
- Активізація ферментативних процесів
- Збільшення врожайності



СКЛАД, Г/Л

N

65

B

150

Моноелементні добрива

Ниватон®СМАРТ БОР

сучасне мікродобриво з бором у формі бор-етаноламіну, доповнене цинком і марганцем, повністю хелатованими ЕДТА, для синергічного впливу. Завдяки вдосконаленій формулі забезпечує глибоке засвоєння бору, стимулюючи рясне цвітіння, формування зав'язі та стабільне підвищення врожайності. Продукт розроблений для листового підживлення широкого спектра культур і адаптований для різних агрокліматичних умов

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Осінь—початок кущення	0,5
Кукурудза	3–5 листків	0,5 – 1,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0
	5–6 пар листків	1,0
Ріпак	2–5 пар листків (осінь)	1,0
	Стеблуння, бутонізація (весна)	1,0 – 1,5
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	0,5 – 1,0
Льон	Стадія «ялинки»	1,0
Картопля	Бутонізація	0,5 – 1,0
	Рожевий бутон	0,5 – 1,0
	Формування плодів	0,5 – 1,0
Плодові та ягідні	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
		0,5 – 1,0
Виноград	Перед цвітінням	0,5 – 1,0
Суниця	Перед дозріванням	0,5
	Перед цвітінням	
Буяки цукрові	Змикання листків в рядках, міжряддя	0,5 – 1,5

- ☒ Профілактика та лікування дефіциту бору.
- ☐ Синергічна дія мікроелементів (цинк, марганець)
- ☐ Стимулює цвітіння, зав'язування та ріст плодів.
- ☐ Підвищує стійкість до стресових факторів
- ☐ Активація ферментативної активності та фотосинтезу.
- ☐ Підвищення врожайності та покращення якості



СКЛАД, Г/Л

N	B	Zn	Mn	Cu	Mo
45	110	110	0.25	0.5	0.75

Моноелементні добрива

Ниватон® БОР-МОЛІБДЕН

для листового підживлення широкого спектра культур, особливо ефективно для цукрових буряків і бобових. Спеціальна формула забезпечує високе засвоєння, інтенсифікує поглинання азоту, фосфору, калію та обмежує надходження важких металів, сприяючи оптимальному розвитку рослин і підвищенню врожайності.



Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Осінь – початок кущення	0,5
Кукурудза	3–5 листків	0,5 – 1,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0
	5–6 пар листків	1,0
Ріпак	2–5 пар листків (осінь)	1,0
	Стеблуння, бутонізація(весна)	1,0 – 1,5
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Томати, перець,баклажан	Бутонізація	0,5 – 1,0
Льон	Стадія «ялинки»	1,0
Картопля	Бутонізація	0,5 – 1,0
	Рожевий бутон	0,5 – 1,0
Плодові та ягідні	Формування плодів	0,5 – 1,0
	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
Виноград	Перед цвітінням	0,5 – 1,0
	Перед дозріванням	0,5 – 1,0
Суниця	Перед цвітінням	0,5
Буряки цукрові	Змикання листків в рядках, міжряддях	0,5 – 1,5

- ☐ Профілактика та лікування дефіциту бору.
- ☐ Формування репродуктивних органів та збереження зав'язі.
- ☐ Активізація ділення клітин і росту кореневої системи.
- ☐ Стимуляція розвитку листків, квіток і плодів.
- ☐ Підвищення якісних та кількісних показників врожаю.
- ☐ Подовження терміну зберігання продукції.

СКЛАД, Г/Л

N	B	Mo
42	100	10

Моноелементні добрива

Ниватон®ЦИНК 100 EDTA

концентроване мікродобриво цинку, який на 100% хелатований ЕДТА, для листового підживлення. Забезпечує швидку нейтралізацію дефіциту цинку, активізує ферментативні процеси та синтез гормонів росту. Ефективне для польових культур, винограду та плодових дерев, добре поєднується з ЗЗР і іншими мікроелементами у бакових сумішах.

- Стимулює розвиток кореневої системи
- Посилює процеси запліднення
- Підвищує посухо-жаро- та морозостійкість
- Полегшує запилення, сприяє збереженню зав'язі
- Посилює стійкість до збудників грибкових і бактеріальних хвороб
- У рослині підвищується вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин
- Регулює синтез АТФ, обмін ауксинів та РНК
- Приймає участь у окисно-відновлювальних реакцій дихання.



СКЛАД, Г/Л

N	Zn
65	100

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/г)
Зернові	Кущення восени	0,5
	Прапорцевий лист (весна)	0,5
Кукурудза	3–5 листків	0,5 – 1,0
	7–9 листків	0,5 – 1,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0
	5–6 пар листків	1,0
Ріпак	2–5 пар листків (осінь)	1,0
	Бутонізація (весна)	1,0
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	0,5 – 1,0
Картопля	Стеблування	1,0
	Рожевий бутон	0,5 – 1,0
	Формування плодів	0,5 – 1,0
	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
Виноград	Перед цвітінням	1,0 – 2,0
	Після збору урожаю	1,0 – 2,0
Буряки цукрові	Змикання листків в рядках, міжряддях	0,5 – 1,5

Моноелементні добрива

Ниватон®ЦИНК 120 Citric

рідке мікродобриво з високою концентрацією цинку, комплексованого цитриновою кислотою, призначене для листового підживлення сільськогосподарських культур. Забезпечує покращення фотосинтезу, стійкість до стресів та активізацію ферментативних процесів. Препарат швидко компенсує дефіцит цинку, стимулюючи ріст кореневої системи та формування врожаю. Ефективний у бакових сумішах із засобами захисту рослин.

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Кущення восени	0,5
	Прапорцевий лист (весна)	0,5
Кукурудза	3–5 листків	0,5 – 1,0
	7–9 листків	0,5 – 1,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0
	5–6 пар листків	1,0
Рпак	2–5 пар листків (осінь)	1,0
	Бутонізація (весна)	1,0
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Томати,	Бутонізація	0,5 – 1,0
перець, баклажан	Стеблуння	1,0
Картопля	Рожевий бутон	0,5 – 1,0
	Формування плодів	0,5 – 1,0
	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
Виноград	Перед цвітінням	1,0 – 2,0
	Після збору урожаю	1,0 – 2,0
Буряки цукрові	Змикання листків в рядках, міжряддях	0,5 – 1,5

- Підвищує морозо-і посухостійкість культур;
- Забезпечує регулювання живлення цинком у критичні для рослин фази розвитку;
- Покращує стійкість рослин до хвороб;
- Збільшує врожайність культур і покращує їхні якісні показники;
- Поліпшує запліднення квіток;
- Стимулює ефективне засвоєння культурами азоту, калію та магнію.



СКЛАД, Г/Л

N	Zn
65	120

Моноелементні добрива

Ниватон®ЦИНК 65Etidronic

класичне мікродобриво з комплексом цинку з ОЕДФК та макроелементами, призначене для покращення фотосинтезу, стимуляції кореневого росту та розвитку репродуктивних органів. Препарат забезпечує профілактику дефіциту цинку, підвищує стійкість рослин до посухи та інших стресів. Ефективно працює в бакових сумішах із ЗЗР, підтримуючи оптимальний розвиток культур на різних етапах вегетації.

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Кущення восени	0,5
	Прапорцевий лист (весна)	0,5
Кукурудза	3–5 листків	0,5 – 1,0
	7–9 листків	0,5 – 1,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0
	5–6 пар листків	1,0
Рпак	2–5 пар листків (осінь)	1,0
	Бутонізація (весна)	1,0
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	0,5 – 1,0
Картопля	Стеблуння	1,0
	Рожевий бутон	0,5 – 1,0
Плодові та ягідні	Формування плодів	0,5 – 1,0
	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
Виноград	Перед цвітінням	1,0 – 2,0
	Після збору урожаю	1,0 – 2,0
Буряки цукрові	Змикання листків в рядках, міжряддях	0,5 – 1,5

- Швидка профілактика та лікування дефіциту цинку.
- Стимуляція розвитку кореневої системи.
- Покращення фотосинтезу та синтезу АТФ.
- Підвищення стійкості до стресових факторів (посуха, заморозки).
- Оптимізація формування зав'язі та репродуктивних органів.
- Сумісність із ЗЗР у бакових сумішах для комплексного впливу.



СКЛАД, Г/Л

Zn	P ₂ O ₅	K ₂ O
65	100	100

Моноелементні добрива

Ниватон®МІДЬ Citric

мікродобриво з комплексом міді з цитриновою кислотою для оптимального засвоєння. Препарат забезпечує ефективну профілактику та лікування мідьдефіцитних станів, стимулює ферментативну активність, синтез хлорофілу та покращує процеси фотосинтезу. Підвищує стійкість рослин до грибкових і бактеріальних інфекцій, а також покращує формування зав'язі, розвиток кореневої системи та стійкість до стресових факторів (посуха, заморозки).

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Кущення восени	0,5
	Початок виходу в трубку - колосіння	0,5 – 1,0
Сорго, просо, ярі зернові	Початок виходу в трубку	0,5 – 1,0
Баштанні	Перед цвітінням	0,5
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	0,5 – 1,0
Картопля	Бутонізація	0,5
Плодові (зерняткові, косточкові)	Початок формування плодів	0,5 – 1,0
	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
Виноград	Бутонізація	0,5 – 1,0
Передпосівна обробка насіння	Разом з протруйником	0,5 – 1,5 л/т

- Ефективна профілактика та лікування дефіциту міді.
- Стимулює синтез хлорофілу та покращує фотосинтез.
- Підвищує стійкість до грибкових і бактеріальних хвороб.
- Стимулює розвиток кореневої системи та формування зав'язі.
- Підвищує стійкість рослин до стресів (посуха, заморозки).
- Препарат використовується окремо від засобів захисту



СКЛАД, Г/Л

Cu

65

Моноелементні добрива

Ниватон® МІДЬ EDTA

мікродобриво з міддю, 100% хелатованою ЕДТА, для забезпечення максимального засвоєння мікроелемента рослинами та покращеної бакової сумісності із ЗЗР. Сприяє синтезу хлорофілу, покращує фотосинтез та активізує ферментативні процеси, які впливають на ріст і розвиток рослин. Підвищує стійкість до грибкових та бактеріальних хвороб, посилює кореневу систему та формування зав'язі. Завдяки хелатуванню ЕДТА, препарат ефективно працює навіть у жорсткій воді та легко комбінується із засобами захисту рослин у бакових сумішах.

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Кущення восени	0,5
	Початок виходу в трубку - колосіння	0,5 – 1,0
Сорго, просо, ярі зернові	Початок виходу в трубку	0,5 – 1,0
Баштанні	Перед цвітінням	0,5
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	1,0 – 1,5
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	0,5 – 1,0
Картопля	Бутонізація	0,5
Плодові (зерняткові, косточкові)	Початок формування плодів	0,5 – 1,0
Виноград	Ранній післязбиральний період	1,0 – 2,0
	Бутонізація	0,5 – 1,0
Передпосівна обробка насіння	Разом з протруйником	0,5 – 1,5 л/т

- Максимальне засвоєння міді
- Стійкість до зовнішніх умов
- Стабільність у бакових сумішах
- Покращення фотосинтезу
- Підвищення стійкості до хвороб
- Стійкість до абіотичних стресів



СКЛАД, Г/Л

Cu

65

Моноелементні добрива

Ниватон®МАРГАНЕЦЬ EDTA

високоєфективне мікродобриво з марганцем, 100% хелатованим ЕДТА, що забезпечує корекцію дефіциту марганцю та активацію ключових біохімічних процесів у рослинах. Сприяє інтенсивному фотосинтезу, синтезу хлорофілу та обміну азоту, підвищуючи ефективність засвоєння макро-і мікроелементів. Завдяки посиленню дихальних і ферментативних процесів препарат покращує ріст кореневої системи, формування зав'язі та підвищує стійкість рослин до стресів і хвороб. Сумісний із засобами захисту рослин у бакових сумішах.

- Нормалізується азотний обмін у рослинах, активізуються процеси синтезу білка;
- Покращується водний обмін;
- Активує процеси ділення клітин рослин;
- Підвищується вміст білка та клітковини у зерні;
- Збільшення кількості хлорофілу в листі;
- Підвищення стійкості до несприятливих умов та хвороб.



СКЛАД, Г/Л

N

30

Mn

60

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Озимі і ярі зернові	Кущення восени та навесні	0,5 – 1,5
Кукурудза, сорго, просо	7–9 листків	0,5 – 1,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0
	5–6 пар листків	1,0
Бобові (горох, соя)	Початок бутонізації	0,5 – 1,0
Овочеві	Початок плодоутворення	0,5 – 1,0
Картопля	Бутонізація	1,0 – 1,5
Плодові, ягідн	Початок плодоутворення	1,0 – 1,5
Горіхи	Бутонізація	1,0 – 1,5
Виноград	Бутонізація	1,0 – 1,5
Передпосівна обробка насіння	Разом з основним протруйником	0,5 – 1,5

Моноелементні добрива

Ниватон® МОЛІБДЕН

мікродобриво з високою концентрацією молібдену та фосфору, що забезпечує корекцію дефіциту цього мікроелемента, особливо важливого для азотного обміну в рослинах. Стимулює активність нітратредуктази, сприяючи ефективному засвоєнню азоту та синтезу білків. Підвищує продуктивність фотосинтезу, стійкість до стресів і покращує якісні показники врожаю. Завдяки своїй формулі підходить для широкого спектра культур і легко комбінується з іншими агрохімікатами в бакових сумішах.

- Профілактика і лікування мікроелементозів, викликаних дефіцитом молібдену; фосфору та калію
- Нормалізується азотний обмін у рослинах, активізуються процеси синтезу білка;
- Покращується водний обмін;
- Поліпшується азотфіксація;
- Підвищується вміст білка та клітковини у зерні;
- Підвищується вміст цукру та вітамінів.

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Кукурудза, сорго, просо	5–7 листків – викидання волоті	0,5
Баштанні	Ріст пагонів	0,5
	Бутонізація	0,5
Бобові (горох, соя)	Бутонізація	0,5
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	0,5
Картопля	Бутонізація	0,5
	Рожевий бутон	0,5 – 1,0
Плодові та ягідні	Початок дозрівання плодів - дозрівання	0,5 – 1,0
Виноград	Бутонізація	1,0 – 2,0



СКЛАД, Г/Л

Mo	P ₂ O ₅	K ₂ O
40	60	70

Моноелементні добрива

Ниватон® КОБАЛЬТ-МОЛІБДЕН

Мікродобриво призначене для листового підживлення широкого спектру культур. Спеціально розроблена формула дозволила отримати склад із максимальним ступенем засвоєння, що забезпечує високу ефективність. Хелатуючим агентом у добриві служить EDTA, найбільш природний для рослин. Застосування добрива Ниватон® Молібден–Кобальт інтенсифікує поглинання рослинами азоту, фосфору, калію, магнію та обмежує надходження важких металів. Комбінація Молібдену та Кобальту максимально позитивно впливає на розмноження бульбочкових бактерій

- Профілактика і лікування мікроелементозів, викликаних дефіцитом кобальту та молібдену;
- Нормалізується азотний обмін у рослинах, активізуються процеси синтезу білка;
- Покращується водний обмін;
- Поліпшується азотфіксація;
- Підвищується вміст білка та клітковини у зерні;
- Підвищується вміст цукру та вітамінів.

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Кукурудза	3–5 листків	0,5
Сорго-Просо	7–9 листків	0,5
Зернобобові	Бутонізація	0,5
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	0,5
Баштанні	Ріст пагонів – бутонізація	0,5
Картопля	Бутонізація	0,5
Плодові (зерняткові, косточкові), горіхи	Перед цвітінням	0,5 – 1,0
	Після збору урожаю	0,5 – 1,0
Виноград	Бутонізація	0,5 – 1,0
	Після збору урожаю	0,5 – 1,0
Передпосівна обробка	Разом з основним протруйником	0,5 – 1,5 л/т



СКЛАД, Г/Л

N	P ₂ O ₅	Mo	Co
50	50	80	0.5

Моноелементні добрива

Ниватон® КАЛІЙ

Висококонцентроване калійне добриво, що містить в своєму складі солі органічних кислот. Такий «органічний» калій, максимально повно засвоюється рослиною. Забезпечує стійкість рослин до полягання під час посухи. Підвищується вміст цукрів, вітамінів, крохмалю. Збільшується тривалість зберігання.

- Ефективне забезпечення калієм
- Профілактика дефіциту калію
- Підвищує вміст вуглеводів в плодах
- Активізує відтік асимілятів



СКЛАД, Г/Л

N

K₂O

40

360

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Озима і яря пшениця, озимий і ярий ячмінь	Кущення осіннє та весняне	1,0 – 1,5
	Вихід в трубку – прапорцевий листок	1,0 – 2,0
Кукурудза	3–5 листків	1,0 – 1,5
	7–9 листків	
Озимий і ярий ріпак, гірчичя	Осінь: 6–10 листків	1,0 – 1,5
	Весняна розетка – стеблуння	
Соняшник	Бутонізація (перед цвітінням)	1,0 – 1,5
	2–3 пари листків	
Цукрові і кормові буряки	5–6 пар листків	1,0 – 1,5
	4–6 листків	
	Змикання листків в рядках	1,0 – 2,0

- Підвищує стійкість рослин до низьких температур
- Підвищення стійкості до грибкових захворювань
- Підвищення врожайності
- Підвищення якості врожаю (смак, колір)



НИВАТОН®
Секрет успіху високого врожаю

Комплексні мікродобрива



Комплексні мікродобрива

- ☐ Ниватон® Зернові
- ☐ Ниватон® Олійні
- ☐ Ниватон® Кукурудза
- ☐ Ниватон® Бобові
- ☐ Ниватон® Універсал
- ☐ Ниватон® Дебют
- ☐ Ниватон® Сірка Лист



Комплексні мікродобрива

СКЛАД, Г/Л

Ниватон® ЗЕРНОВІ

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Zn	B	Mn	Cu	Mo	Co
60	60	80	30	15	6	7	16	0,15	0,075

Концентроване, комплексне й легкозасвоюване мікродобриво, що містить усі елементи живлення, необхідні для повноцінного росту й розвитку рослини. Оригінальний склад мікродобрива розроблений на основі багаторічного досвіду, що забезпечує рослину ключовими елементами живлення та дозволяє отримати врожай найкращої якості.

- Прискорює обмінні процеси в культурі на клітинному рівні;
- Виявляє фунгіцидні властивості, підвищує імунітет культур, забезпечує антистресовий і стимулювальний вплив;
- Задовольняє потреби культур у біологічно активних елементах мінерального живлення, що виносяться урожаєм;

Активує поглинання головних елементів
мінерального живлення (N, P, K)
Збільшує врожайність на 10–25 % і поліпшує
показники якості зерна

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Озимі та ярі зернові	Фаза 5–7 листків	1,0
	Кущення – вихід в трубку	1,5 – 2,0
	Кінець виходу в трубку – молочна стиглість	1,5 – 2,0
Передпосівна обробка	Разом з основним протруйником	1,0 – 2,0



Комплексні мікродобрива

СКЛАД, Г/Л

Ниватон® ОЛІЙНІ

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Zn	B	Mn	Cu	Mo	Co
60	50	80	20	12	6	10	10	0,1	0,05

Концентроване, комплексне й легкозасвоюване мікродобриво, що містить усі необхідні для повноцінного росту й розвитку рослини елементи живлення. Оригінальний склад мікродобрива розроблений для оптимального живлення олійних культур (соняшнику, ріпаку) з урахуванням усіх потреб цих рослин.

- Активує обмінні процеси в культурі на клітинному рівні;
- Виявляє фунгіцидні властивості, підвищує імунітет культур, забезпечує антистресовий і стимулюючий вплив;

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Соняшник	Фаза 3–5 пар листків	1,5 – 2,0
	Фаза 6–8 пар листків	2,0
	Осінь – фаза 6–8 листків	2,0
Ріпак озимий	Весна – відновлення вегетації	2,0
	Бутонізація – молочна стиглість насіння	2,0
	Фаза 6–8 пар листків	1,5 – 2,0
Ріпак ярий	Бутонізація – молочна стиглість насіння	1,5 – 2,0
Передпосівна обробка	Разом з основним протруйником	2,0

- Задовольняє потреби культур у біологічно активних елементах мінерального живлення, які виносяться урожаєм;
- Активує поглинання головних елементів мінерального живлення (N, P, K) кореневою системою на 10–15 %;
- Підвищує врожайність на 10–25 % і поліпшує показники якості зерна



Комплексні мікродобрива

СКЛАД, Г/Л

Ниватон® КУКУРУДЗА

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Zn	B	Mn	Cu	Mo	Co
60	60	70	30	20	5	8	15	0,15	0,075

Концентроване, комплексне й легкозасвоюване мікродобриво, що містить усі необхідні для повноцінного росту й розвитку рослини елементи живлення. Оригінальний склад мікродобрива розроблений для оптимального живлення кукурудзи з урахуванням усіх потреб даної культури. Оптимізоване добриво, створене на основі багаторічного досвіду, забезпечує рослини ключовими елементами живлення та дозволяє отримати високий врожай найкращої якості

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Кукурудза, сорго	Фаза 3–5 листків	2,0
	Фаза 7–9 листків	2,0

- ☐ Прискорює обмінні процеси в культурі на клітинному рівні;
- ☐ Виявляє фунгіцидні властивості, підвищує імунітет культур, забезпечує антистресовий і стимулювальний вплив;
- ☐ Задовольняє потреби культур у біологічно активних елементах мінерального живлення, що виносяться урожаєм;
- ☐ Активує поглинання головних елементів мінерального живлення (N, P, K) кореневою системою на 10–15 %;
- ☐ Збільшує врожайність на 10–25 % і поліпшує показники якості зерна.



Комплексні мікродобрива

СКЛАД, Г/Л

Ниватон® БОБОВІ

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	SO ₃	Zn	B	Mn	Cu	Mo	Co
60	40	75	20	10	10	10	7	1,25	0,75

Концентроване, комплексне й легкозасвоюване мікродобриво, що містить усі необхідні для повноцінного росту й розвитку рослини елементи живлення. Оригінальний склад добрива ідеально підходить для обробки посівного матеріалу й листового підживлення бобових рослин на всіх фазах розвитку. Високий вміст кобальту й молібдену, необхідних для повноцінного розвитку симбіотичних азот-фіксуючих бактерій, робить це добриво незамінним помічником при вирощуванні бобових і дозволяє отримати врожай найкращої якості

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Соя, горох, нут, сочевиця	Обробка насіння	1,0 – 2,0 л/т
	2–3 трійчастих листків	1,0 – 1,5
	Бутонізація	1,0 – 2,0
Кормові бобові культури (люцерна, буркун)	Обробка насіння	1,0 – 2,0 л/т
	Бутонізації	1,0 – 2,0

- ☐ Активує поглинання головних елементів мінерального живлення (N, P, K) кореневою системою на 10–15 %;
- ☐ Збільшує врожайність на 10–25 % і поліпшує показники якості зерна.

- ☐ Прискорює обмінні процеси в культурі на клітинному рівні;
- ☐ Виявляє фунгіцидні властивості, підвищує імунітет культур, забезпечує антистресовий і стимулювальний вплив;
- ☐ Задовольняє потреби культур у біологічно активних елементах мінерального живлення, що виносяться урожаєм;



Комплексні мікродобрива

Ниватон®Універсал

N-BH ₂	SO ₃	MgO	B	Cu	Fe	Zn	Mn	Mo	Co
40	40	10	5	4	4	4	2	0,5	0,05

мікродобриво для обробки насіння з комплексом хелатованих мікроелементів (100% EDTA). Препарат сприяє швидкому розвитку кореневої системи, оптимізує обмін речовин та підвищує стійкість до стресів. Високий вміст цинку, бору, марганцю та молібдену покращує синтез білків, фіксацію азоту та стійкість до грибкових захворювань. Забезпечує рівномірний ріст рослин та збільшення врожайності. Добриво сумісне з іншими препаратами та ефективне у передпосівній обробці зернових.

- ☐ Збалансоване забезпечення мікроелементами з перших днів росту забезпечує правильний розвиток рослин, що позитивно впливає на кількість і якість врожаю.
- ☐ Цинк (Zn): Сприяє синтезу білків і регулює ріст рослин.
- ☐ Бор (B): Необхідний для розвитку меристем і проростків.
- ☐ Марганець (Mn): Посилює фотосинтез і підвищує стійкість до хвороб.
- ☐ Мідь (Cu): Зміцнює клітинні стінки й захищає від грибкових захворювань.
- ☐ Молібден (Mo): Потрібний для азотного обміну.
- ☐ Характеризується також високою змішуваністю з іншими препаратами. Володіє буферними властивостями.



Комплексні мікродобрива

Ниватон®СІРКА ЛИСТ

Високоєфективне сірчано-азотне мікродобриво, у формі водорозчинного концентрату, що містить сірку в сульфатній формі і азот в амонійній формі, а також повний набір хелатованих ЕДТА мікроелементів, необхідних для нормального росту і розвитку всіх типів культур

- ❑ Високий вміст сірки у біодоступній формі забезпечує синтез амінокислот та білків
- ❑ Хелатована форма мікроелементів підвищує ефективність засвоєння
- ❑ Підвищує стійкість до стресових умов (посуха, заморозки)
- ❑ Покращує фотосинтез та продуктивність культур
- ❑ Підвищує врожайність та якість продукції
- ❑ Сумісність із ЗЗР у бакових сумішах забезпечує комплексний вплив.

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	2–4 листка – прапорцевий лист	1,0 – 3,0
Озимий та ярий ріпак	4–6 листків – бутонізація	1,0 – 2,0
Кукурудза	3–5 листків; 7–9 листків	1,0 – 3,0
Соняшник	2–4 пари – 6–8 пар листків	1,0 – 3,0
Сорго, просо	6–8 листків	1,0 – 3,0
Бобові	3–5 листків – бутонізація	1,0 – 3,0
Буряки цукрові та кормові	Змикання листків в рядках	1,0 – 3,0
Томати, перець, баклажан	Бутонізація	1,0 – 2,0
Баштанні	Ріст пагонів - бутонізація	1,0 – 2,0
Картопля	Бутонізація	1,0 – 2,0
Плодові (зерняткові, кісточкові)	Бутонізація; після збору урожаю	2,0 – 5,0
Виноград	Бутонізація; після збору урожаю	2,0 – 5,0



СКЛАД, Г/Л

N	SO ₃	Mn	B	Zn	Cu	Mo	Fe
125	250	1	1	0.5	0.5	0.1	1

Біостимулятори та антистресанти



НИВАТОН®
Секрет успіху високого врожаю



Біостимулятори та антистресанти, передпосівна обробка насіння

- Ниватон® Кафіт
- Ниватон® Дуофос
- Ниватон® Амінофіт
- Ниватон® Антистрес

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ

Ниватон® Енерджі
Ниватон® Зернятко



Біостимулятори та антистресанти

Ниватон®КАФІТ

висококонтентоване добриво, що містить калій, фосфіти, органічні кислоти та амінокислоти. Біостимулюючі властивості фосфітів роблять їх незамінними помічниками агронома й дозволяють виростити здорові рослини з міцним імунітетом, стійким до різних фітопатогенів і несприятливих впливів навколишнього середовища.

- Доступні форми фосфору та калію забезпечують приріст урожайності, якість продукції та покращений зовнішній вигляд плодів.
- Профілактика та лікування елементозів, викликаних стресом.
- Запобігання дефіциту калію та фосфору (фосфор у формі фосфітів).
- Активація імунітету та стійкість до грибкових і бактеріальних захворювань.
- Легке засвоєння компонентів рослинами.
- Підвищення природної стійкості до патогенів.



PO₃

420

K₂O

290

Амінокислоти
органічні

7,5

Бурштинова
кислота

0.5

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Озимі та ярі зернові	Кущення восени та навесні	0,5
Кукурудза	3–5 листків	1,0
	7–9 листків	2,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0 – 1,5
	6–6 пар листків	1,0 – 2,0
Ріпак озимий	6 пар листків (осінь)	1,0 – 2,0
	Відновлення вегетації (весна)	1,0 – 2,0
Бобові (горох, соя)	3–5 трійчастих листків	1,0 – 1,5
	Формування бобів – дозрівання	1,5 – 2,0
Томати, перець, баклажан	4–6 справжніх листків	1,0 – 1,5
	Початок формування плодів	1,0
Картопля	Бутонізація – початок цвітіння	1,0 – 2,0
Плодові та ягідні	Початок формування плодів	1,0 – 2,0
	Після збирання плодів	2,0 – 3,0
Виноград	Перед цвітінням	1,0 – 2,0
Буряки цукрові та кормові	4–6 листків	0,5 – 1,5
	Змикання листків у рядках	1,5 – 2,0
Овочеві (огірки, капуста, цибуля, часник, буряк столовий та морква)	Для розсадних культур – через 7–10 днів після висадки або 4–6 справжніх листків	1,5 – 2,0

Біостимулятори та антистресанти

Ниватон®ДУОФОС

Фосфорно-калійне добриво, що містить різні форми фосфору, калій, органічні кислоти. Особливістю даного складу є унікальна комбінація двох форм фосфору, що дозволяє одночасно проводити підживлення доступним фосфором і калієм. Добриво універсальне. Високоєфективне на всіх с/г культурах

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Озимі та ярі зернові	Кущення восени та навесні	0,5
Кукурудза	3–5 листків	1,0
	7–9 листків	2,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0 – 1,5
	6–6 пар листків	1,0 – 2,0
Ріпак озимий	6 пар листків (осінь)	1,0 – 2,0
	Відновлення вегетації (весна)	1,0 – 2,0
Бобові (горох, соя)	3–5 трійчастих листків	1,0 – 1,5
	Формування бобів – дозрівання	1,5 – 2,0
Томати, перець, баклажан	4–6 справжніх листків	1,0 – 1,5
	Початок формування плодів	1,0
Картопля	Бутонізація – початок цвітіння	1,0 – 2,0
Плодові та ягідні	Початок формування плодів	1,0 – 2,0
	Після збирання плодів	2,0 – 3,0
Виноград	Перед цвітінням	1,0 – 2,0
	4–6 листків	0,5 – 1,5
Буряки цукрові та кормові	Змикання листків у рядках	1,5 – 2,0
Овочеві (огірки, капуста, цибуля, часник, буряк столовий та морква)	Для розсадних культур – через 7–10 діб після висадки або 4–6 справжніх листків	1,5 – 2,0

- Доступні форми фосфору та калію для приросту урожайності та якості плодів.
- Профілактика дефіциту елементів і лікування стресових елементозів.
- Антистресовий комплекс органічних речовин.
- Активація імунітету та захист від захворювань.
- Легке засвоєння та природна стійкість до патогенів.
- Препаративна форма: розчинний.

P_2O_5 сумарний	Лізін			
250	7,5			
PO_4	PO_3	K_2O	Саліцилова кислота	Бурштинова кислота
125	125	250	5,0	2,5



Біостимулятори та антистресанти

Ниватон®АМІНОФІТ

Інноваційне добриво, яке поєднує біостимулюючі та фунгіцидні властивості фосфітів калію та антистресову дію біотехнологічних L-амінокислот

- Має фунгіцидну дію на рослину
- Потужна біостимуляторна дія на кореневу систему

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові	Кущення восени та навесні	1,0 – 1,5
	Прапорцевий лист - колосіння	1,0 – 2,0
Кукурудза	3–5 листків	1,0 – 2,0
	7–9 листків	1,0 – 2,0
Соняшник	2–3 пари листків	1,0 – 1,5
	6–8 пар листків	1,0 – 2,0
Ріпак озимий	6 пар листків (осінь)	1,0 – 2,0
	Відновлення вегетації (весна)	1,0 – 2,0
Бобові (горох, соя)	3–5 трійчастих листків	1,0 – 1,5
	Формування бобів – дозрівання	1,5 – 2,0
Томати, перець, баклажан	4–6 справжніх листків	1,0 – 1,5
	Початок формування плодів	1,0
Картопля	Бутонізація – початок цвітіння	1,5 – 3,0
Плодові та ягідні	Початок формування плодів	1,0 – 2,0
	Перед початком цвітіння	1,0 – 2,0
Виноград	2–4 пари листків	1,0 – 2,0
	30–40 днів до збирання	1,0 – 2,0

- Підвищує рівень стійкості до стресових ситуацій
- Стимулюють ріст і розвиток рослин
- Сприяє зменшенню витрат енергії при азотному метаболізмі
- Істотно підвищує врожай



PO ₃	K ₂ O	Вільні L-амінокислоти
200	140	75

Біостимуляторита антистресанти

Ниватон® АНТИСТРЕС

Спеціалізований продукт із найбільшим у лінійці вмістом біотехнологічних L-амінокислот та комплексом мікроелементів, активізує плин біохімічних процесів, підвищує імунітет та стійкість рослин до несприятливих погодних умов та негативного впливу ЗЗР

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Всі культури	Передпосівна обробка насіння	0,5 л/т
Кріопротектор і адаптоген в осінній період для озимих культур	Осінь за 5–7 діб до настання сталих мінусових температур	0,5 – 1,0
Антистресант у період вегетації	Перед настанням стресових ситуацій (посухи, приморозків, пестицидного впливу)	0,5 – 1,0
Прилипач	При кожному внесенні	0,5 – 1,0

- ☐ Сприяє відновленню протікання біохімічних процесів у клітинах;
- ☐ Допомогає долати стрес у рослинах;
- ☐ Пришвидшує ріст і розвиток рослин; ;
- ☐ Стимулюють ріст і розвиток рослин;
- ☐ Підвищує імунітет;
- ☐ Покращує процеси запилення та зав'язування плодів;
- ☐ Істотно підвищує врожай.



Вільні L-амінокислоти	Цинк Zn (EDTA)	Марганець Mn (EDTA)	Бор
100	10	5,0	2,0

Передпосівна
обробка
насіння



НИВАТОН®
Секрет успіху високого врожаю

Передпосівна обробка насіння

Ниватон® ЕНЕРДЖІ

Добриво призначене для забезпечення вегетуючих рослин доступними формами мікроелементів. Воно є безбаластним комплексом повністю хелатованих EDTA мікроелементів.

Призначене для передпосівної обробки насіння та фоліарного внесення, збагачення РКД тощо.

Дібраний комплекс високочистих фітогормонів призначений для стимуляції росту кореневої системи.

Біотехнологічні L-амінокислоти виступають гарним будівельним матеріалом для зростаючих рослин. Характеризується гарною змішуваністю з іншими препаратами.

Культура	Фаза росту і розвитку	ВВСН	Нормавитрати
Зернові, зернобобові, технічні та овочеві	Обробка насіння	00	1-2л/т
Озима і яра пшениця (ячмінь)	Кущення	21...29	1...2л/га
	Вихід в трубку–прапорцевий лист	30...49	2л/га
	Молочно-воскова стиглість	83...87	1-2л/га
Кукурудза	3-8 листків	13...18	1-2л/га
Соняшник	2-3 пари листків	14...16	1-2л/га
	5-6 пари листків	30...33	2л/га
	Бутонізація (фаза зірочки)	51...55	2л/га
Ріпак			
Соя			
Цукровий і кормовий буряк	4-6 листків –активний ріст коренеплодів	14...49	1-2л/га
Плодово-ягідні	Перед цвітінням– збір врожаю	51...89	0,1-0,5л/100л


N-NH₂
23
[Zn(EDTA)]²⁻
35
[Mn(EDTA)]
25
[Cu(EDTA)]²⁻
10
[Fe(EDTA)]⁻
1
MoO₄²⁻
0.1
[Co(EDTA)]²⁻
0.02
Вільні L-амінокислоти
30
Фітогормони
25 ppm
в т.ч. ауксини
20 ppm

Передпосівна обробка насіння

Ниватон®ЗЕРНЯТКО

Преміальний продукт на ринку України яке відноситься і до фосфорних добрив з високим вмістом фосфітів та калію, і до біостимуляторів та антистресантів з оптимальним вмістом амінокислот та фітогормонів ауксинового типу

Культури	Фази розвитку	Норми витрати (л/га)
Зернові, кукурудза, соняшник	Передпосівна обробка насіння	1,0 – 2,0 л/т
Озимі та ярі зернові	Кушення восени та навесні Вихід в трубку – прапорцевий лист	1,0 – 2,0
Кукурудза	3–5 листків 7–9 листків	1,0 2,0
Соняшник	2–3 пари листків 6–8 пар листків	1,0 – 1,5 1,0 – 2,0
Ріпак озимий	6 пар листків (осінь) Відновлення вегетації (весна)	1,0 – 2,0 1,0 – 2,0
Бобові (горох, соя)	3–5 трійчастих листків формування бобів – дозрівання	1,0 – 1,5 1,5 – 2,0
Томати, перець, баклажан	4–6 справжніх листків Початок формування плодів	1,0 – 1,5 1,0
Картопля	Бутонізація – початок цвітіння	1,0 – 2,0
Плодові та ягідні	Початок формування плодів Після збирання плодів	1,0 – 2,0 2,0 – 3,0
Виноград	Перед цвітінням	1,0 – 2,0
Буряки цукрові та кормові	4–6 листків Змикання листків у рядках	0,5 – 1,5 1,5 – 2,0
Овочеві (огірки, капуста, цибуля, часник, буряк столовий та морква)	Для розсадних культур – через 7–10 діб після висадки або 4–6 справжніх листків	1,5 – 2,0

- Стимуляція раннього розвитку кореневої системи.
- Оптимізація обміну речовин та інтенсивного росту на початкових етапах.
- Підвищення енергії проростання та польової схожості насіння.
- Покращення стійкості до стресів та несприятливих умов.
- Підвищення врожайності та якості продукції.
- Сумісність із іншими добривами для передпосівної обробки.



P₂O₅
сумарний
420

K₂O
290

Амінокислоти
5

Фітогормони
25 ppm

Спеціальні продукти



НИВАТОН®

Секрет успіху високого врожаю



Спеціальні продукти

- Ниватон® ПінаГеть
- Ниватон® Прилипайко
- Ниватон® Зауер



Спеціальні продукти

Ниватон® ПінаГеть

ад'ювант органосиліконової групи, що запобігає утворенню піни в баках обприскувачів навіть після її появи. Препарат не змінює структуру робочого розчину та забезпечує моментальний результат. Економить час під час обприскування культур, зменшуючи простої, пов'язані з утворенням піни. Покращує ефективність захисту рослин, знижуючи втрати робочих розчинів. Оптимальний для використання в системах захисту та підживлення рослин у різних умовах.

Запобігає утворенню піни в баку оприскувача;

Не змінює структуру робочого розчину;

Економія часу в процесі обприскування культур, відсутність необхідності чекати, коли піна осяде;

Збільшує ефективність захисту, особливо в переддощову погоду;

Поліпшення ефективності використовуваних добрив завдяки запобіганню витікання піни, в якій міститься велика кількість активних речовин;

Забезпечує моментальний результат.



Спеціальні продукти

Ниватон® Прилипайко

Органосиліконовий сурфактант-прилипач, що забезпечує покращення покриття, утримання та проникнення робочих розчинів у рослинні тканини. Призначений для підвищення ефективності гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів та мікроелементів у польових, плодових і спеціальних культурах. Сприяє зменшенню норми хімічних препаратів, покращує змочування поверхні листків і знижує стікання розчинів. Підвищує ефективність дії пестицидів навіть у складних погодних умовах завдяки оптимальному розподілу на поверхні рослин.

- ☐ Покращує покриття та утримання робочих розчинів на рослинній поверхні.
- ☐ Знижує норми внесення хімічних препаратів без втрати ефективності.
- ☐ Сприяє швидкому та рівномірному проникненню активних речовин у тканини рослин.
- ☐ Зменшує стікання розчинів і втрати препаратів.
- ☐ Підвищує ефективність пестицидів навіть у складних погодних умовах.
- ☐ Оптимізує змочування та обробку поверхонь завдяки рівномірному розподілу.



Спеціальні продукти

Ниватон®ЗАУЕР

Це високоефективна суміш для буферизації і стабілізації розчинів пестицидів і агрохімікатів. Продукт знижує рН робочого розчину та зменшує його жорсткість. За рахунок цього відбувається повна і ефективна дія застосовуваних пестицидів і агрохімікатів. Збалансований склад продукту ефективно знижує рН і жорсткість робочого розчину незалежно від походження води, що використовуються для обприскування посівів с/г культур. Використання Ниватон®ЗАУЕР може знизити рН робочого розчину і утримувати його на прийнятному рівні навіть при використанні потужних підлужнювачів УУ, як наприклад боретаноламін (у випадку застосування якісного продукту).

Ефективна буферизація та стабілізація

Поліпшення ефективності обприскування

Зменшення піноутворення випаровування

Стабільна дія навіть у жорсткій воді

Простота та безпечність у використанні

Зменшення витрат ресурсів

Захист навколишнього середовища: мінімізує втрати діючих речовин завдяки зменшенню випаровування та піноутворення.



Рідкі
комплексні
добрива



НИВАТОН®
Секрет успіху високого врожаю

Рідкі комплексні добрива

Компанія виготовляє рідкі комплексні добрива (РКД) різного складу, адаптуючи їх до **індивідуальних потреб замовника**. Завдяки відпрацьованим технологіям і використанню якісної сировини, РКД характеризуються мінімальними значеннями сольового індексу, що забезпечує їх безпечне застосування та ефективність. Компанія також має досвід **інтеграції функціональних добавок до РКД**, що дозволяє покращити властивості добрив, забезпечуючи оптимальне живлення рослин на стартових етапах їхнього розвитку.

Популярними марками є:

НРК 8-24-0

НРК 5-20-5

НРК 3-18-18



Дослідження та якість



НИВАТОН®
Секрет успіху високого врожаю



Дослідження та якість

ТМ Ниватон® дотримується високих стандартів контролю якості на кожному етапі виробництва, починаючи від відбору сировини до тестування готових мікродобрих. Завдяки сучасному лабораторному обладнанню та кваліфікованим технологам, продукція відповідає міжнародним нормам. Постійне вдосконалення рецептур та використання інноваційних хелатуючих агентів забезпечують високу ефективність добрив. Місія компанії — гарантувати стабільність і продуктивність аграрних рішень для партнерів, що шукають надійні рішення для живлення культур



Дослідження та якість

ТМ Ниватон® приділяє особливу увагу впровадженню новітніх досліджень та наукових підходів у виробництво мікродобрив.

Кожна партія проходить ретельний контроль якості в сертифікованих лабораторіях із сучасним обладнанням.

Завдяки співпраці з агрохімічними та біотехнологічними установами, формули продукції постійно вдосконалюються.

Ниватон® забезпечує своїх партнерів продукцією, що відповідає найвищим міжнародним стандартам.





Обирайте ТМ Ниватон ® як надійного партнера для підвищення продуктивності вашого агробізнесу. Інноваційні формули, підтверджені польовими випробуваннями та строгим контролем якості, забезпечать максимальний результат на кожному етапі розвитку культур. Працюйте з якістю, яка відповідає вимогам сучасного сільського господарства, та забезпечте майбутні врожаї вже сьогодні!



НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ

Phone

+380 98 160-00-95



Email

sale@nivaton.com.ua



Website

www.nivaton.com.ua



Location

Києво-Святошинський район,
село Нове, вул. Промислова, 19



НИВАТОН®
Секрет успіху високого врожаю