



РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ



 Стартове добриво (внесення з посівом)	Фаза 3-5 листків (BBCH 13-15)	Фаза 7-9 листків (BBCH 17-19)	Фаза 9-11 листків – викидання волоті (BBCH 19-59)
--	---	---	---

БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	РКД 8-24-0 30 л	• Ниватон Дебют: 1 л/га • Ниватон Цинк 100: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Кукурудза: 1 л/га • Ниватон Цинк 100: 0,5 л/га • Ниватор Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Зауер: 0,1 л / 100 л води • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)		Забезпечує сильний стартовий імпульс, активний ріст кореня і листя. Створює антистресову, стимулюючу дію на ранньому етапі.	Сприяє розвитку генеративних органів. Покращує кореневе живлення та ефективність фотосинтезу. Підвищує стійкість до стресів і забезпечує баланс поживних речовин у критичну фазу розвитку.

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	РКД 8-24-0 50 - 80 л	• Ниватон Енерджі: 1 л/га • Ниватон Дебют: 1 л/га • Ниватон Цинк 100: 0,5 л/га • Ниватор Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Кукурудза: 2 л/га • Ниватон Цинк 100: 0,5 л/га • Ниватон Сірка лист: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 1 л/га • Ниватон Калій: 1,5 л/га • Ниватон Сірка лист: 1 л/га • Ниватон Антистрес: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Покращує стартове живлення рослин.	Стимулює стартовий ріст рослини, особливо розвиток потужної кореневої системи. Забезпечує антистресовий захист, сприяє кращому засвоєнню елементів живлення.	Сприяє формуванню генеративних органів, інтенсивному нарощуванню біомаси, максимізації фотосинтетичної активності.	Захищає врожайність на рівні генеративних органів. Підвищує ефективність використання азоту та води. Зменшує вплив стресів.



РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ПІДЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ




Обробка насіння (BBCH 00)	Фаза кущання: осіннє (BBCH 11-13)	Відновлення вегетації: весняне кущання (BBCH 28-29)	Вихід в трубку: поява прапорцевого листка (BBCH 30-39)	Налив зерна (BBCH 71-79)
---------------------------------	---	--	---	--------------------------------

БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	• Ниватон Зернятко: 1 л/т	• Ниватон Зернятко: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Магній: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Зернові: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Швидкі та дружні сходи. Сильна коренева система. Стійкість до стресів на старті. Краща перезимівля завдяки зміцненню рослин в осінній період.	Стимуляція кореневого живлення. Антистресовий ефект після зими. Покращення фотосинтетичної активності.	Посилене утворення і розвиток прапорцевого листка. Покращення засвоєння поживних речовин. Підвищення стійкості до стресів. Активізація формування зерен із високими технологічними якостями.	Покращення заповнення зерна, збільшення маси 1000 зерен. Підвищення вмісту білка та інших якісних показників. Підвищення загальної врожайності та якості.

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	- Ниватон Зернятко: 0,5 л/т - Ниватор Енерджі: 0,7 л/т	- Ниватон Дуофос: 0,5 л/га - Ниватор Марганець: 1 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Зернятко: 1,5 л/га - Ниватор Антистрес: 0,5 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Кафіт: 0,5 л/га - Ниватон Магній: 1 л/га - Ниватон Сірка Лист: 1 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Зернові: 1,5 л/га - Ниватон Сірка Лист: 1 л/га - Ниватор Калій: 1 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Дружні сходи, потужна коренева система. Покращення засвоєння пожив- них речовин після проростання. Підвищена зимостійкість і рівномірність розвитку.	Потужне кушення до зими. Рівномірний розвиток рослин. Підвищена стій- кість до морозів, посухи та хвороб. Зменшення стресу протруйників.	Активізація росту кореневої системи. Посилене кушен- ня - формування продуктивних пагонів. Підвищення стій- кості до весняних стресів. Покращення за- своєння поживних речовин з ґрунту.	Активний розви- ток прапорцевого листка. Покращення ефективності фотосинтезу, що збільшує потенціал урожайності. Підвищення стресостійкості.	Поліпшення наливу зерна. Підвищення вміс- ту білка та клейко- вини в зерні.



РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ПІДЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ



БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ


Назва, кількість препарату на 1 га	РКД 3-18-18 30 - 40 л/га	- Ниватон Сمارт Бор: 0,7 л/га - Ниватон Енерджі: 1 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Бор 150: 0,5 л/га - Ниватон Сірка Лист: 1 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Бор 150: 1 л/га - Ниватон Олійні: 1 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Стимулювання розвитку, росту кореневої системи і вегетативної маси рослин соняшнику (технологія In-FURROW).	Сприяє активному розвитку вегетативної маси, кореневої системи та закладанню генеративних органів.	Активізація білкового синтезу, покращення мінерального живлення, поліпшення закладки кошика.	Стимулювання транспортних процесів, сприяє кращому зав'язуванню насіння.

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	РКД 3-18-18 50 - 70 л/га	- Ниватон Бор 150: 0,5 л/га - Ниватон Енерджі: 1 л/га - Ниватон Дуофос: 0,5 л/га - Ниватон Антистрес: 0,5 л/га - Ниватон Зауер: 0,1 л / 100 л води - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Бор 150: 0,5 л/га - Ниватон Сірка Лист: 1 л/га - Ниватон Олійні: 1 л/га - Ниватон Зауер: 0,1 л / 100 л води - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Бор 150: 1 л/га - Ниватон Олійні: 1,5 л/га - Ниватон Антистрес: 1 л/га - Ниватон Зауер: 0,1 л / 100 л води - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	- Ниватон Олійні: 1 л/га - Ниватон Калій: 1 л/га - Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Потужний старт, підвищена енергія росту, покращення посухостійкості. (технологія POP-UP).	Активно сприяє формуванню потужної розетки листків і кореневої системи, що є основою для формування кошика.	Підтримка інтенсивного росту та закладки кошика. Активізація метаболізму - краща стійкість до стресів	Краща закладка та налив кошика. Зменшення ризику стерильності пилку. Покращення стійкості до посухи. Рівномірність цвітіння і запилення.	Підвищення олійності. Кращий налив насіння. Продовження активності листка-флагмана, який «годує» кошик.



РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ПІДЖИВЛЕННЯ **coi**



БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	РКД 3-18-18: 20 - 30 л		• Ниватон Молібден - Кобальт: 0,5 л/га • Ниватон Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор: 1 л/га • Ниватон Цинк: 0,5 л/га • Ниватон Зауер: 0,1 л / 100 л води • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	
Мета внесення (обробки)			Покращення укорінення, зменшення після гербіцидного пригнічення, підвищення ефективності дії інокуляції.	Сприяє кращому зав'язуванню бобів, живленню азотом, зменшує абортацию квіток.	Запобігання абортивності бобів, підвищення енергії наливу бобу, підвищення стресостійкості.	

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	РКД 5-20-5 змікро. 0,2%: 40 - 50 л	Ниватон Бобові: 1 л/т	• Ниватон Молібден - Кобальт: 0,5 л/га • Ниватон Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Зернятко - 1 л/т • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Бобові: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор: 1 л/га • Ниватон Цинк: 0,5 л/га • Ниватон Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Зауер: 0,1 л / 100 л води • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бобові: 1 л/га • Ниватон Калій: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)			Швидкий розвиток листової маси, покращення азотфіксації. Підвищення імунітету, менше пригнічення від гербіцидів.	Зменшення абортивності квіток і бобів. Збільшення кількості зав'язі, покращення білкового живлення.	Збереження бобів. Підвищення білковості насіння та стійкості до спеки.	Покращення наливу насіння, зменшення стресів, підтримка роботи фотосинтетичного апарату в умовах природного старіння, підвищення рівномірності дозрівання.



РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ПІДЖИВЛЕННЯ РІПАКУ



**Фаза
4-6 листків**
(BBCH 14-16)



**Утворення
розетки**
(BBCH 20-22)



Бутонізація
(BBCH 50-59)



**Утворення
стручків**
(BBCH 71-74)

БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	• Ниватон Бор 150: 1 л/га • Ниватон Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Дуофос: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	
Мета внесення (обробки)	Покращення розвитку кореня та розетки. Підвищення вмісту цукрів у тканинах. Знімання стресу після гербіцидів.	Активация весняного старту, зниження стресу, стимуляція закладки генеративних органів.	Покращення зав'язування стручків, збільшення кількості насіння у стручку.	

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	• Ниватон Бор 150: 1 л/га • Ниватон Калій: 1 л/га • Ниватон Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Дуофос: 1 л/га • Ниватон Амінофіт: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бобові: 1,5 л/га • Ниватон Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Антистрес: 0,5 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Формування потужної кореневої системи, акумуляція цукрів у тканинах. Зняття стресу після гербіцидів.	Активация росту, профілактика бор дефіциту, покращення фосфорного живлення, коренеутворення. Зміцнення рослини перед інтенсивним генеративним розвитком.	Покращення якості бутонів, зменшення абортівності, підвищення ефективності азотного живлення та стресостійкості.	Зменшення втрат стручків, покращення наливу насіння. Підвищення вмісту олії та зміцнення рослин до стресових умов.



РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ ПІДЖИВЛЕННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

			
Фаза 4-6 листків (ВВСН 15-16)	Змикання листіків у рядках (ВВСН 17-19)	Змикання листіків в міжряддях (ВВСН 31-39)	Фаза активного росту коренеплодів (ВВСН 41-49)

БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	• Ниватон Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Дуофос: 0,5 л/га • Ниватон Антистрес: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Зернятко: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор - Молібден: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Смарт Бор: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Стимулювання росту кореневої системи, запобігання гнилі сердечка. Підвищення толерантності після ЗЗР. Сприяння закладці потенціалу врожаю.	Стабілізація борного живлення, активація фотосинтезу, збільшення площі асиміляції.	Забезпечує посилене засвоєння азоту, стимуляцію фотосинтезу. Профілактика чорної бактеріальної плямистості та якісне формування коренеплоду.	Інтенсивне накопичення маси коренеплоду, підвищення цукристості, профілактика хвороб.

ІНТЕНСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

Назва, кількість препарату на 1 га	• Ниватон Бор 150: 0,5 л/га • Ниватон Дуофос: 0,5 л/га • Ниватон Антистрес: 1 л/га • Ниватон Енерджі: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор 150: 1 л/га • Ниватон Зернятко: 1,5 л/га • Ниватон Кафіт: 1,5 л/га • Ниватон Антистрес: 1 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Бор - Молібден: 1 л/га • Ниватон Цинк: 0,5 л/га • Ниватон Сірка Лист: 1 л/га • Ниватон Зауер: 0,1 л / 100 л води • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води	• Ниватон Смарт Бор: 1 л/га • Ниватон Сірка Лист: 2 л/га • Ниватон Калій: 2 л/га • Ниватон Амінофіт: 2 л/га • Ниватон Прилипайко: 0,03 л / 100 л води
Мета внесення (обробки)	Потужне вкорінення та ріст розетки. Підвищення стійкості до стресів. Профілактика серцевинної гнилі.	Підтримка інтенсивного росту кореня і листової маси, стійкість до спеки, нестачі вологи.	Стимулювання фотосинтезу, засвоєння азоту та нарощування маси коренеплоду. Профілактика хвороб.	Збільшення приросту кореня, цукристості. Підвищення стійкості до спеки та посухи, зниження ризику хвороб.